



Futtermittelbewertung

Betrieb:

Betriebsnummer:

Schätzung des TS-Gehaltes in Silagen

Gehäckseltes Futter wird zwischen den Händen zu einem Ball geformt und unterschiedlich intensiv gepresst, bzw. lang strukturiertes Futter wird ausgewrungen.

TS %

< 20	Handinnenflächen tropfnass bzw. bei leichtem Druck auf das Siliergut fließt Saft ab
20 - 25	Handinnenflächen feucht, bei kräftigem Druck ist Saft abzupressen
25 - 30	Saft kann nicht abgepresst werden, nur bei Wringen tritt Saft aus
30 - 35	bei Wringen werden die Handflächen nur leicht feucht
> 35	auch bei kräftigem Druck bleiben die Handflächen trocken
> 50	Material gewinnt heuähnlichen Charakter, sperrig - hart - klamm im Griff

Botanische Zusammensetzung

gräserreich:	mehr als 70 % Gräser (mehr als 50 % grobstenglige Kräuter)
ausgewogen:	zwischen 50 - 70 % Gräser
leguminosereich:	mehr als 50 % Klee
kräuterreich:	mehr als 50 % feinblättrige Kräuter viel feinblättrige Kräuter und viel Klee



	Heu <input type="checkbox"/> belüftet <input type="checkbox"/> unbelüftet	Emd <input type="checkbox"/> belüftet <input type="checkbox"/> unbelüftet	Grassilage <input type="checkbox"/> angewelkt	Maissilage
Geruch	<input type="checkbox"/> aromatisch <input type="checkbox"/> dumpf <input type="checkbox"/> muffig <input type="checkbox"/> schimmelig <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> aromatisch <input type="checkbox"/> dumpf <input type="checkbox"/> muffig <input type="checkbox"/> schimmelig <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> aromatisch <input type="checkbox"/> dumpf <input type="checkbox"/> muffig <input type="checkbox"/> schimmelig <input type="checkbox"/> hefig-stockig <input type="checkbox"/> Buttersäure <input type="checkbox"/> Ammoniak <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> aromatisch <input type="checkbox"/> dumpf <input type="checkbox"/> muffig <input type="checkbox"/> schimmelig <input type="checkbox"/> hefig-stockig <input type="checkbox"/> Buttersäure <input type="checkbox"/> Ammoniak <input type="checkbox"/>	
Farbe	<input type="checkbox"/> kräftig grün <input type="checkbox"/> ausgebleichen <input type="checkbox"/> schmutzig grau <input type="checkbox"/> nesterweise grau-weiss <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kräftig grün <input type="checkbox"/> ausgebleichen <input type="checkbox"/> schmutzig grau <input type="checkbox"/> nesterweise grau-weiss <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> produkttypisch <input type="checkbox"/> schmutzig grau <input type="checkbox"/> bräunl.-schwarz <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> produkttypisch <input type="checkbox"/>	
Griff	<input type="checkbox"/> weich, blattreich <input type="checkbox"/> stengelreich <input type="checkbox"/> strohig hart <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> klamm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> weich, blattreich <input type="checkbox"/> stengelreich <input type="checkbox"/> strohig hart <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> klamm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Erwärmung TS-Gehalt*: <input type="checkbox"/> < 20 % <input type="checkbox"/> 20 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 30 % <input type="checkbox"/> 30 - 35 % <input type="checkbox"/> > 35 % <input type="checkbox"/> > 50 % <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Erwärmung TS-Gehalt*: <input type="checkbox"/> < 20 % <input type="checkbox"/> 20 - 25 % <input type="checkbox"/> 25 - 30 % <input type="checkbox"/> 30 - 35 % <input type="checkbox"/> > 35 % <input type="checkbox"/> > 50 % <input type="checkbox"/>	
Botanische Zusammensetzung	<input type="checkbox"/> ausgewogen <input type="checkbox"/> gräserreich <input type="checkbox"/> leguminosereich <input type="checkbox"/> kräuterreich	<input type="checkbox"/> ausgewogen <input type="checkbox"/> gräserreich <input type="checkbox"/> leguminosereich <input type="checkbox"/> kräuterreich	<input type="checkbox"/> ausgewogen <input type="checkbox"/> gräserreich <input type="checkbox"/> leguminosereich <input type="checkbox"/> kräuterreich	<input type="checkbox"/> Blüte <input type="checkbox"/> Milchreife <input type="checkbox"/> Teigreife <input type="checkbox"/> Gelbreife	
Nutzungsstadium	<input type="checkbox"/> früh <input type="checkbox"/> mittelfrüh <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> mittelspät <input type="checkbox"/> spät	<input type="checkbox"/> früh <input type="checkbox"/> mittelfrüh <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> mittelspät <input type="checkbox"/> spät	<input type="checkbox"/> früh <input type="checkbox"/> mittelfrüh <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> mittelspät <input type="checkbox"/> spät	<input type="checkbox"/> Ganzpflanzens. <input type="checkbox"/> Kolbensilage <input type="checkbox"/> Körnersilage	
Struktur / Form	<input type="checkbox"/> fein <input type="checkbox"/> grob <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> fein <input type="checkbox"/> grob <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Strukturverlust (schleimig) <input type="checkbox"/>	Häcksellänge: <input type="checkbox"/> Körner geruetscht <input type="checkbox"/>	
Verunreinigungen	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> Sand / Erde <input type="checkbox"/> Schimmel <input type="checkbox"/> Käfer, Milben <input type="checkbox"/> Giftpflanzen <input type="checkbox"/> vereinzelt/ Nester <input type="checkbox"/> häufig <input type="checkbox"/> nicht beurteilt <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> Sand / Erde <input type="checkbox"/> Schimmel <input type="checkbox"/> Käfer, Milben <input type="checkbox"/> Giftpflanzen <input type="checkbox"/> vereinzelt/ Nester <input type="checkbox"/> häufig <input type="checkbox"/> nicht beurteilt <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> Sand / Erde <input type="checkbox"/> Schimmel <input type="checkbox"/> Käfer, Milben <input type="checkbox"/> Giftpflanzen <input type="checkbox"/> vereinzelt/ Nester <input type="checkbox"/> häufig <input type="checkbox"/> nicht beurteilt <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> Sand / Erde <input type="checkbox"/> Schimmel <input type="checkbox"/> Käfer, Milben <input type="checkbox"/> Giftpflanzen <input type="checkbox"/> vereinzelt/ Nester <input type="checkbox"/> häufig <input type="checkbox"/> nicht beurteilt <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> Sand / Erde <input type="checkbox"/> Schimmel <input type="checkbox"/> Käfer, Milben <input type="checkbox"/> Giftpflanzen <input type="checkbox"/> vereinzelt/ Nester <input type="checkbox"/> häufig <input type="checkbox"/> nicht beurteilt <input type="checkbox"/>
Geschätzter Gehalt	NEL: APD:				
Qualität	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> befriedigend <input type="checkbox"/> mässig <input type="checkbox"/> ungenügend	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> befriedigend <input type="checkbox"/> mässig <input type="checkbox"/> ungenügend	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> befriedigend <input type="checkbox"/> mässig <input type="checkbox"/> ungenügend	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> befriedigend <input type="checkbox"/> mässig <input type="checkbox"/> ungenügend	<input type="checkbox"/> sehr gut <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> befriedigend <input type="checkbox"/> mässig <input type="checkbox"/> ungenügend
Bemerkungen



Nutzungsstadium

	Nutzungsstadium				
	1 früh	2 mittelfrüh	3 mittel	4 mittelspät	5 spät
Erste Nutzung im Frühling Hauptgras = Leitpflanze	Beginn Schossen bis Weidestadium	Weidestadium bis Beginn Rispen-schieben	Beginn Rispen- schieben	Volles Rispen- schieben	Ende Rispen- schieben
Löwenzahn = Leitpflanze	Beginn Blüte z.T. noch Knospen	Vollblüte	Vollblüte z.T. einzelne verblüht	Verblüht z.T. einzelne Samenstände	Samenstände z.T. Samen verweht
Zeitperiode (z.B. für Rot- klee, Luzerne	Ende April bis Beginn Mai	Mitte Mai	ca. 20. - 25. Mai (Beginn Blüte)	Ende Mai	Beginn Juni
Folgende Nutzungen	4 - 5 Wochen altes Futter	5 - 6 Wochen altes Futter	6 - 7 Wochen altes Futter	8 - 10 Wochen altes Futter	
Letzte Nutzung	4 - 6 Wochen altes Futter	7 - 10 Wochen altes Futter			