

Audit

Cabinet :

Date :

Domaines de l'audit :

Domaine PCI ¹	Sujet	Critère d'évaluation	Pas appliqué	Partiellement appliqué	Entièrement appliqué	Commentaire
Gestion de la PCI¹	Manuel d'hygiène	Manuel d'hygiène qui comprend les domaines de prévention des infections pertinents et qui est mis à disposition des collaborateurs sous forme écrite/en ligne.				
	Personne/équipe assignée à la PCI ¹	Personne ou groupe de personnes (dans les grandes cliniques) définis responsable de la mise en œuvre, du contrôle et de l'enseignement de la PCI ¹ et possédant les connaissances appropriées. Pour les groupes PCI ¹ , des réunions régulières ont lieu.				
	Collaborateurs	Le personnel est impliqué dans la PCI ¹ .				
	Audits réguliers / surveillance	Audits PCI ¹ réalisés à intervalles réguliers dans les cliniques/cabinets par la personne/l'équipe assignée ou par un conseiller PCI ¹ externe. Évaluation de la conformité du personnel et de la connaissance des mesures de PCI ¹ .				
	Maladies soumises à l'obligation d'annoncer	Liste de toutes les maladies soumises à l'obligation d'annoncer et des numéros de contact disponibles pour les autorités vétérinaires et sanitaires.				
Formation du personnel	Régularité	Formation annuelle documentée sur la PCI ¹ et les pratiques de protection. Les nouveaux collaborateurs et les stagiaires sont formés et reçoivent des informations sur la pratique de la PCI ¹ .				

Domaine PCI ¹	Sujet	Critère d'évaluation	Pas appliqué	Partiellement appliqué	Entièrement appliqué	Commentaire
	Hygiène des mains	Formation à intervalles réguliers de tout le personnel travaillant dans le domaine clinique sur le moment et la manière dont l'hygiène des mains devrait être appliquée.				
	Mesures de protection	Formations sur les mesures de protection.				
	PCI ¹ générale	Formations régulières sur la prévention et le contrôle des infections pour tous les collaborateurs travaillant dans la clinique.				
	Utilisation prudente des antibiotiques	Formations régulières sur l'utilisation prudente des antibiotiques pour tous les collaborateurs qui prescrivent ou utilisent des antibiotiques.				
	Détection précoce des patients potentiellement infectieux	Le personnel a été formé à identifier les patients potentiellement infectieux lors de la prise de rendez-vous. Déterminer si des mesures de contrôle des infections sont nécessaires avant que l'animal n'entre dans le cabinet. Liste des symptômes des maladies infectieuses potentielles à disposition des réceptionnistes.				
Nettoyage et désinfection	Protocole écrits et actualisés	Protocoles de désinfection avec type de désinfection, concentrations et temps d'action pour les différentes zones et les différents appareils ; check-lists écrites pour confirmer le nettoyage et la désinfection réguliers dans les différentes zones.				
	Spectre et application	Désinfectants autorisés à des fins cliniques avec un spectre bactéricide et virucide suffisant et utilisés conformément aux instructions du fabricant ; procédures de nettoyage permettant d'éliminer les substances organiques et de réaliser une désinfection appropriée.				

Domaine PCI ¹	Sujet	Critère d'évaluation	Pas appliqué	Partiellement appliqué	Entièrement appliqué	Commentaire
	Autoclave	Indicateurs de stérilité pour le contrôle qualité, utilisés dans les emballages autoclavés. Indicateurs biologiques utilisés régulièrement pour assurer une stérilisation adéquate. Résultats enregistrés.				
	Diffusion de l'information.	Protocoles écrits dans tous les domaines, à disposition de tous ceux qui participent au processus de nettoyage et désinfection. Les fiches de données de sécurité pour les désinfectants sont disponibles.				
Déchets	Déchets tranchants et piquants	Utilisation de conteneurs autorisés, résistants aux perforations et étiquetés. Conteneurs remplis au maximum au ¾. Conteneurs accessibles dans toutes les zones requises. Les objets tranchants sont éliminés immédiatement après utilisation.				
	Déchets biologiques spéciaux	Des directives claires sur l'élimination adéquate de ces déchets sont disponibles.				
Contrôle des vecteurs	Contrôle des rongeurs	Les restes de nourriture sont éliminés et il n'y a pas de désordre. Les points d'entrée sont obturés. Il n'y a pas d'eau stagnante sur le terrain où se situe la clinique. Les fenêtres sont équipées d'une moustiquaire.				
Locaux de traitement	Lavabos	Des lavabos sont disponibles dans tous les locaux de traitement.				
	Matériel	Seul le matériel essentiel se trouve sur les surfaces de rangement.				

Domaine PCI ¹	Sujet	Critère d'évaluation	Pas appliqué	Partiellement appliqué	Entièrement appliqué	Commentaire
Mesures d'isolement	Structure et procédures de travail	<p><u>Pour les cliniques</u> : séparation physique des patients atteints de maladies potentiellement contagieuses des autres patients ; station d'isolement permettant une séparation adéquate des patients et avec une zone en amont équipée de désinfectant pour les mains et de tenues de protection ; des ustensiles et appareils sont attribués à chaque patient et restent dans la zone d'isolement jusqu'au nettoyage final/à la désinfection finale. Pas de matériel supplémentaire dans le local d'isolement.</p> <p><u>Pour les cabinets</u> : les patients potentiellement contagieux sont invités à se présenter au cabinet après les autres consultations ; les déplacements des patients dans le cabinet sont limités.</p>				
	Diffusion de l'information	Les maladies qui requièrent des mesures spécifiques d'isolement / de protection sont spécifiées et les informations sous forme écrite sont à disposition de tous les collaborateurs.				
	Nettoyage / désinfection	Des désinfectants efficaces également contre les parvovirus et les spores fongiques sont utilisés dans les zones d'isolement ; les procédures de nettoyage et de désinfection sont définies et à disposition de tous les collaborateurs. Des pédiluves ou des tapis de désinfection sont en place.				
Directives pour les patients porteurs de MDRO²	Définition/identification des patients MDRO ²	Les MDRO ² sont définis et les patients atteints d'infections dues à des MDRO ² sont identifiés.				
	Mesures de protection	Les patients atteints d'infections dues à des MDRO ² sont séparés physiquement des autres patients, les déplacements des patients dans l'établissement sont limités, les procédures de désinfection sont définies.				

Domaine PCI ¹	Sujet	Critère d'évaluation	Pas appliqué	Partiellement appliqué	Entièrement appliqué	Commentaire
Hygiène des mains	Désinfectants pour les mains	Les désinfectants pour les mains dans des distributeurs à usage unique sont disponibles à tous les postes de lavage des mains. Tous les locaux de consultation et de traitement, les stations, laboratoires et toilettes sont équipés de postes de lavage des mains.				
	Lotion pour le lavage des mains.	Des lotions médicales pour le lavage des mains dans des distributeurs à usage unique sont disponibles à tous les postes de lavage des mains (voir ci-dessus).				
	Produits de protection de la peau	Des produits de protection de la peau sont disponibles à tous les postes de lavage des mains (voir ci-dessus).				
	Essuie-mains à usage unique	Utilisation d'essuie-mains à usage unique à tous les postes de lavage des mains (voir ci-dessus).				
Hygiène du personnel	Vêtements de travail	Tenues de travail (pantalons et haut ou blouse) fournies à tout le personnel.				
	Bijoux pour les mains et ongles	Pas de bijoux pour les mains (montres, bagues, bracelets ou autres), pas d'ongles longs ou artificiels ni de vernis à ongles pour les employés qui participent au travail clinique.				
	Consommation de nourriture	Les collaborateurs ne mangent pas dans les zones réservées aux patients.				
	Conservation de la nourriture	La nourriture des collaborateurs n'est pas conservée dans les zones réservées aux patients/réfrigérateurs réservés à l'usage professionnel.				
	Vestiaires du personnel	Vestiaires pour tout le personnel permettant de séparer les vêtements privés des vêtements de travail.				

Domaine PCI ¹	Sujet	Critère d'évaluation	Pas appliqué	Partiellement appliqué	Entièrement appliqué	Commentaire
	Linge	Le changement quotidien de vêtements de travail est prescrit ; les vêtements de travail sont nettoyés par une entreprise externe ou dans un lave-linge interne à la clinique. Linge séché à haute température (65-70° C). Linge infectieux trempé dans une solution de blanchiment. Le linge sale est transporté correctement. Le linge propre est séparé du linge sale. Des produits d'hygiène pour les mains sont disponibles dans la buanderie.				
Protection du personnel	Vaccinations	La vaccination contre la rage et contre le tétanos est recommandée pour tout le personnel et les coûts sont pris en charge par la clinique/le cabinet.				
	Mesures pour les collaboratrices enceintes / le personnel immunosupprimé	Les mesures de protection en cas de grossesse et/ou d'immunosuppression sont définies et communiquées à tous les collaborateurs.				
	Zoonoses	Protocoles écrits pour le contrôle de l'exposition potentielle du personnel aux agents zoonotiques.				
	Morsures d'animaux	Les directives concernant les morsures d'animaux sont disponibles.				
Tenue de protection	Ensemble	Équipement de protection complet, y c. blouse de protection ou combinaison à usage unique, gants, couvre-chaussures, protection oculaire et masque (chirurgical, masque N95).				
	Utilisation	Les situations dans lesquelles des vêtements de travail et leur utilisation correcte sont prescrits sont communiquées par écrit à tous les collaborateurs participant au travail clinique.				
	Stockage et mise à disposition	Tenue de protection à l'entrée de la zone d'isolement avec un faible risque de contamination.				

Domaine PCI ¹	Sujet	Critère d'évaluation	Pas appliqué	Partiellement appliqué	Entièrement appliqué	Commentaire
Médicaments	Préparation	Préparation des médicaments dans une zone de travail propre et désinfectée ; éviter de préparer les médicaments à l'avance. Travail effectué proprement lors du prélèvement des médicaments.				
	Stockage	Stockage conforme aux prescriptions officielles (par ex. température, durée de stockage) ; dans un local propre / au réfrigérateur ; sans contact avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des échantillons des patients.				
	Datage des flacons entamés	Le datage des flacons entamés est effectué systématiquement pour tous les médicaments.				
Utilisation des antibiotiques	Directives concernant l'utilisation et le dosage de substances antimicrobiennes	Directives spécifiques concernant l'utilisation et le dosage d'antibiotiques pour tous les collaborateurs impliqués dans la prescription et l'utilisation d'antibiotiques.				
	Restrictions pour les antibiotiques d'importance critique	Utilisation restreinte ou interdite des antibiotiques de dernier recours, les restrictions sont communiquées et connues de tous les collaborateurs.				
Autres	Échantillons diagnostiques	Zone désignée pour la manipulation des échantillons diagnostiques.				
	Viande crue	Directives concernant l'alimentation des animaux hospitalisés avec de la viande crue.				
	Matériel d'information pour les clients	Matériel d'information écrit pour les clients sur les zoonoses.				
	Directives concernant les animaux des refuges pour animaux	Directives concernant l'admission des animaux provenant de refuges pour animaux ou d'animaux errants.				

Abréviations : ¹PCI, prévention et contrôle des infections ; ²MDRO, organismes multi-résistants (*multidrug resistant organisms*)Source : adapté d'après Stull et al. 2018 AAHA Infection Control, Prevention, and Biosecurity Guidelines. J Am Anim Hosp Assoc. 2018 ; 54(6) : 297-326.