














BEISPIEL FÜR DIE EINTEILUNG VON QUARANTÄNESTUFEN BEI HUND UND KATZE DES TIERSPITALS ZÜRICH

Stall	Handschuhe	Schutzmantel	Schuhüberzug	Eigenes US-Material	Einschränkung Betreuungspersonal	Erkrankung (Fett = Zoonose-Risiko)	Desinfektionsmittel	Einwirkzeit
Normaler Stall					Bei Zoonosen kein Kontakt zu schwangeren oder immunsupprimierten Personen!	Nicht/zureichend geimpfte Hunde & Katzen (>3 Jahre nicht geimpft oder nur Grundimmunisierung), FeLV, FIV, FIP, Leptospirose , Bartonella henselae Infektion, Ausscheider von Würmern (Toxocara, Dipylidium, Ancylostoma, Trichuris, u.a.)		

Stall	Handschuhe	Schutzmantel	Schuhüberzug	Eigenes US-Material	Einschränkung Betreuungspersonal	Erkrankung (Fett = Zoonose-Risiko)	Desinfektionsmittel	Einwirkzeit
Überwachungsstall			 generell im Stall		Bei Zoonosen kein Kontakt zu schwangeren oder immunsupprimierten Personen!	MDR Patienten, Findlingskatzen, Patienten mit unklarer Diagnose und geringgradigem Verdacht auf ansteckende Infektionskrankheit		

Stall	Handschuhe	Schutzmantel	Schuhüberzug	Eigenes US-Material	Einschränkung Betreuungspersonal	Erkrankung (Fett = Zoonose-Risiko)	Desinfektionsmittel	Einwirkzeit
Seuchenstall					Bei Zoonosen kein Kontakt zu schwangeren oder immunsupprimierten Personen!	Staupe, Parvovirose/Panleukopenie, Hepatitis contagiosa canis, Katzenschnupfen (ausser virulent-systemische FCV!), Zwingerhusten, Herpesinfektion Hund, Pilzinfektion , Brucellose (<i>Brucella canis</i>)* , bekannte Ausscheider von Toxoplasmen, Echinokokken, Salmonellen, Campylobacter *zusätzlich Atemschutz		

Stall	Handschuhe	Schutzkleidung	Schuhüberzug	Eigenes US-Material	Einschränkung Betreuungspersonal	Erkrankung (Fett = Zoonose-Risiko)	Desinfektionsmittel	Einwirkzeit
Seuchenstall absperren!					Betreuung NUR durch speziell zugewiesene Personen!	Virulent-systemische Calicivirusinfektion, Mykobakterieninfektion (<i>M. bovis</i>, <i>M. tuberculosis</i>, <i>M. microti</i>)* , Tollwut-Verdacht** * zusätzlich Atemschutz ** Aufnahme nur nach Rücksprache mit kantonalem Veterinäramt!		