














EXEMPLE DE CLASSIFICATION DES NIVEAUX DE QUARANTAINE CHEZ LES CHIENS ET LES CHATS À L'HÔPITAL VÉTÉRIINAIRE DE ZURICH

Chenil	Gants	Blouse de protection	Couvre-chaussures	Propre matériel d'examen	Restriction du personnel soignant	Maladie (en gras = risque de zoonose)	Désinfectant	Temps d'action
Chenil normal					En cas de <b>zoonoses</b> , aucun contact avec les personnes enceintes ou immunosupprimées !	Chiens et chats pas/insuffisamment vaccinés (pas vaccinés depuis > 3 ans ou seulement vaccination de base), FeLV, FIV, FIP, leptospirose, infection due à <b>Bartonella henselae</b> , excréteurs de vers (par ex. <b>Toxocara</b> , <b>Dipylidium</b> , <b>Ancylostoma</b> , <b>Trichuris</b> )		

Chenil	Gants	Blouse de protection	Couvre-chaussures	Propre matériel d'examen	Restriction du personnel soignant	Maladie (en gras = risque de zoonose)	Désinfectant	Temps d'action
Chenil de surveillance					En cas de <b>zoonoses</b> , aucun contact avec les personnes enceintes ou immunosupprimées !	Patients MDR, chats errants, patients dont le diagnostic n'est pas clair et avec une légère suspicion de maladie infectieuse contagieuse.		

Chenil	Gants	Blouse de protection	Couvre-chaussures	Propre matériel d'examen	Restriction du personnel soignant	Maladie (en gras = risque de zoonose)	Désinfectant	Temps d'action
Chenil réservé aux cas d'épizootie					En cas de <b>zoonoses</b> , aucun contact avec les personnes enceintes ou immunosupprimées !	Maladie de Carré, parvovirose/panleucopénie, hépatite contagieuse canine, coryza du chat (excepté le FCV systémique virulent !), toux du chenil, herpès-virose canine, <b>infection fongique</b> , <b>brucellose (<i>Brucella canis</i>)</b> *, <b>excréteurs connus de toxoplasmes, d'échinocoques, de salmonelles, de campylobacters</b> * en plus, protection respiratoire		

Chenil	Gants	Tenue de protection	Couvre-chaussures	Propre matériel d'examen	Restriction du personnel soignant	Maladie (en gras = risque de zoonose)	Désinfectant	Temps d'action
Fermer l'accès au chenil réservé aux cas d'épizooties !					Prise en charge des animaux <b>UNIQUEMENT</b> par des personnes spécialement désignées à cet effet !	Calicivirose systémique virulente, <b>infection due à des mycobactéries (<i>M. bovis</i>, <i>M. tuberculosis</i>, <i>M. microti</i>)</b> *, <b>suspicion de rage*</b> ** * en plus, protection respiratoire ** admission uniquement après avoir consulté le service vétérinaire cantonal !		