












Plan de désinfection

Clinique pour petits animaux

	Quoi	Avec quoi	Dose	Comment	Quand
	Lavage des mains:	[Lotion traitante de lavage]	1 pression de pompe	Se laver les mains pendant 40 à 60 secondes , les rincer soigneusement puis les sécher avec une serviette à usage unique	Lorsque les mains sont visiblement sales, avant de commencer le travail, après avoir terminé le travail, avant de manger, après être allé aux toilettes
	Désinfection des mains	[Désinfectant à base d'alcool]	Au moins 3 ml	Se frotter soigneusement les mains pendant au moins 30 secondes jusqu'à ce qu'elles soient sèches (y compris espaces interdigités, pouces, bout des doigts, replis des ongles)	1. Avant le contact avec le patient ; 2. Avant les gestes aseptiques ; 3. Après avoir été en contact avec du matériel potentiellement infectieux ; 4. Après le contact avec le patient ; 5. Après avoir été en contact avec l'environnement immédiat du patient.
	Soins des mains	[Lotion de soin]		Après s'être lavé et/ou désinfecté les mains, bien les frictionner avec l'émulsion de soin pour faire pénétrer le produit	Par exemple avant les longues pauses, après la fin du travail
	Désinfection de la peau avant les interventions/ponctions aseptiques	[Antiseptique pour la peau]			
	Désinfection de la peau avant la pose d'un cathéter iv, les ponctions simples	[Antiseptique pour la peau]			Avant la pose de cathéters intraveineux, avant les ponctions simples
	Muqueuse	[Antiseptique pour les muqueuses]			
	Appareils/moniteurs médicaux				Après chaque utilisation Porter des gants !
	Surfaces de travail				Après chaque utilisation Porter des gants !
	Tables de traitement				Après chaque utilisation, sinon 1 x/jour. Porter des gants !
	Boxes des animaux, sols et locaux de traitement				Boxes chaque fois qu'ils ont été salis et après la fin de l'hospitalisation de l'animal Sols 1-2 x/jour. Porter des gants !
	Quarantaine	[Produit efficace contre les virus non enveloppés et les spores]			Lorsque les locaux d'hébergement des animaux sont vides Porter des gants !